

NEUROMIECTOMÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFONÍA ESPASMÓDICA

Procedimiento quirúrgico alternativo a la toxina botulínica

En un intento de mejorar los síntomas de la disfonía espasmódica a largo plazo (e incluso de manera definitiva) estamos llevando a cabo en el Servicio de Otorrinolaringología (Unidad de Voz) del Hospital Universitario “Ramón y Cajal” de Madrid, un procedimiento quirúrgico con el fin de denervar el músculo vocal, que es el responsable final de la disfonía espasmódica en aducción.

Este procedimiento quirúrgico persigue los mismos resultados que la infiltración con toxina botulínica, pero sin la necesidad de tener que hacerlo cada pocos meses, y tratar de conseguirlo de manera definitiva.

Este procedimiento tiene como objetivo mejorar y hacer permanentes técnicas ya utilizadas en otros centros hospitalarios, pero realizándolas mediante un abordaje más seguro y selectivo. La intervención se realiza mediante anestesia general y puede requerir un día de hospitalización.

Los pacientes intervenidos hasta el momento tienen una mejoría muy importante de la voz, con desaparición de los bloqueos y sin necesidad de infiltraciones. Esta mejoría la refieren los pacientes como equivalente a los días de mejor resultado obtenido con la infiltración de toxina.

En caso de que Ud desee ser valorada/o en nuestra Unidad de Voz (o de tener mas información) le atenderemos en los teléfonos de nuestra Secretaría 913368622-3 o en el correo electrónico icobeta.hrc@salud.madrid.org